

Medicijn

Een vroegtijdige diagnose van dementie kan de patiënt en de naaste omgeving veel lijden besparen: de betrokkenen hebben meer tijd zaken te regelen voor de toekomst en er zijn drie medicijnen waarmee het proces enigszins kan worden vertraagd, aldus professor Scheltens (*de Volkskrant*, 30 januari). Op het eerste argument van de hoogleraar cognitieve neurologie valt niets af te dingen, op het tweede helaas wel. De cognitieversterkende medicijnen, de zogenaamde cholinesterase-remmers, werken slechts bij een op de tien patiënten. Bij wie het aanslaat, is niet op voorhand te voorspellen. Een op de drie patiënten ervaart bijwerkingen zoals duizeligheid, maagpijn en leverintoxicatie, die zo erg kunnen zijn dat inname geminderd moet worden of zelfs moet worden gestopt. De geringe vertraging gedurende zes tot negen maanden – bij één op de tien – heeft ook nog een andere prijs: toegenomen bewustzijn van de eigen situatie hetgeen de kans vergroot op depressie, wanhoop en agressie. Om al deze redenen heeft de Belgische minister van Volksgezondheid besloten deze ‘geheugenpillen’ niet op te nemen in het ziekenfondspakket.

TILBURG

Huub Buijssen